35D

433791
Регистрационный номер

Фамилия ПЕТРИК
Имя ДМИТРИЙ
Отчество ИГОРЕВИЧ

(не заполнять)

ДП
Подпись

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета конкурса

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор», профиль «Инженерные науки»,
Олимпиада по математике, Заключительный этап, 10 класс

Вариант 4

1. Петя просматривал календарь 24 века, начиная с 2301 года и заканчивая 2400 годом. Он считал год с номером n «счастливым», если сумма частного и остатка от деления n на 100 являлась делителем числа n. Сколько «счастливых» лет насчитал Петя в 24 веке?
2. При каких значениях параметра a уравнение $\operatorname{tg}a\cdot(x-\operatorname{tg}a)^2+\operatorname{ctg}a\cdot(x-\operatorname{ctg}a)^2=0$ имеет единственное решение.
3. Окружность описана около равнобедренного треугольника $BCD\,(CB=CD)$. На ее дуге BD, не содержащей точки C, взята точка A так, что $\angle BAD=120^0$. Найти площадь четырехугольника $ABCD$, если длина отрезка AC равна 4.

Председатель методической комиссии, 2024 г.

ШИФР: 350
(не заполнять)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

Юниор

Работа по математике

Дата 06.04.2024
Вариант № 4
Площадка написания: НИЯУ МИФИ
ФИО и рег. номер не указывать!

ОЦЕНКА
(не заполнять)

1	2	3	4	5	6	ИТОГО	Подпись
2	3	2				7	

№2

$\log_b a(x-\log_b a)^2 + c\log_b a(x-c\log_b a)^2 = 0$ (*)

$\log_b a(x-\log_b a)^2 + \frac{1}{\log_b a}(x-\frac{1}{\log_b a})^2 = 0$

1. Замена $b = \log_b a$:

$t(x-b)^2 + \frac{1}{b}(x-\frac{1}{b})^2 = 0$ (**)

$t(x^2-2xb+b^2) + \frac{1}{b}(x^2-\frac{2x}{b}+\frac{1}{b^2}) = 0$

$x^2t - 2xb^2 + b^3 + \frac{x^2}{t} - \frac{2x}{b^2} + \frac{1}{b^3} = 0 \mid \cdot t \neq 0$ (т.к. иначе (**) не имеет смысла)

[1] $\begin{cases} x^2t^2 - 2xb^3 + b^4 + x^2 - \frac{2x}{b} + \frac{1}{b^2} = 0 \ (1) \\ b \neq 0 \end{cases}$

1.1. Рассм. (1):

$x^2b^2 + x^2 - 2xb^3 - \frac{2x}{b} + b^4 + \frac{1}{b^2} = 0$

$x^2(b^2+1) - x(2b^3 + \frac{2}{b}) + b^4 + \frac{1}{b^2} = 0$

$D = (2b^3+\frac{2}{b})^2 - 4(b^2+1)(b^4+\frac{1}{b^2}) = 4b^6 + \frac{8b^3}{b} + \frac{4}{b^2} - 4(b^6+1+b^4+\frac{1}{b^2}) =$

$= 4b^6 - 4b^6 + 8b^2 + \frac{4}{b^2} - \frac{4}{b^2} - 4 - 4b^4 = -4b^4 + 8b^2 - 4$

Т.к. по усл. ур-е (*) (а следовательно ур-е (**)) должно имеет 1 реш. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} D = 0 \ (1) \\ D > 0 \\ x_1 = x_2 \ (2) \end{array}\right.$

1.1.1. Рассм. (1):

$0 = t^4 - t^3 - t^2 + t$

	1	0	−1	0
1	1	1	0	0

$\Rightarrow t = 1$ — корень

$0 = (t-1)(t^3 + t^2 - 1)$

	1	1	0	−1
1	1	2	2	1

$\Rightarrow t = -1$ — корень

$0 = (t+1)^2 (t^2 - t + 1)$

$D = 1 - 4 = -3 < 0 \Rightarrow$ нет корней

$t_{1,2} = \frac{0 \pm \sqrt{-3}}{2} = \pm i$

$0 = (t+1)^2 (t-1)^2$

$\left[\begin{array}{l} t = 1 \\ t = -1 \end{array}\right.$

1.1.3. Верно в сист. (1):

$\left\{\begin{array}{l} \left[\begin{array}{l} t = 1 \\ t = -1 \end{array}\right. \\ t \neq 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t \leq 1 \\ t \leq -1 \end{array}\right.$

1.2. Зам. (2):

$\left\{\begin{array}{l} t^4 + t^2 - t^3 - 1 \geq 0 \\ \frac{2t^3 + t^2 - \sqrt{t^6 + t^4 - 2t^3 + t^2}}{2t^2} = \frac{t^2 + t - 1}{t} \end{array}\right.$

$\frac{2t^3 + t^2 - \sqrt{t^2(t^4 + t^2 - 2t + 1)}}{2t^2} = \frac{t^2 + t - 1}{t}$

$\frac{2t^3 + t^2 - |t|\sqrt{t^4 + t^2 - 2t + 1}}{2t^2} = \frac{t^2 + t - 1}{t}$

$\frac{2t^3 + t^2 - |t|\sqrt{(t^2 - t + 1)^2}}{2t^2} = \frac{t^2 + t - 1}{t}$

$\frac{2t^3 + t^2 - |t|(t^2 - t + 1)}{2t^2} = \frac{t^2 + t - 1}{t}$

$\frac{2t^3 + t^2 - |t|(t^2 - t + 1)}{2t^2} - \frac{t^2 + t - 1}{t} = 0$

$\frac{2t^3 + t^2 - |t|(t^2 - t + 1) - 2t^3 - 2t^2 + 2t}{2t^2} = 0$

$\frac{-t^2 + t - |t|(t^2 - t + 1)}{2t^2} = 0$

$\left\{\begin{array}{l} -t^2 + t - |t|(t^2 - t + 1) = 0 \\ t \neq 0 \end{array}\right.$



$\left\{\begin{array}{l} t \in (-\infty; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; +\infty) \\ |(t-1)(t+1)| = 0 \\ t^2 + 1 \neq 0 \end{array}\right.$

$t \in (-\infty; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; +\infty)$

$(t-1)(t+1) = 0$

$t^2 \neq -1$ — верно, при любом $t \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} t \neq -1; 1 \\ \left[\begin{array}{l} t = -1 \\ t = 1 \end{array}\right. \end{array}\right. \Leftrightarrow t \in \varnothing$

2. Обратная замена:

2.1. Если $t = 1 \Rightarrow \operatorname{tg} x = 1$

$x = \left\{\frac{\pi}{4} + 2\pi n;\ \frac{5\pi}{4} + 2\pi n\right\}, n \in \mathbb{Z}$



2.2. Если $t = -1 \Rightarrow \operatorname{tg} x = -1$

$x \in \left\{-\frac{\pi}{4} + 2\pi k;\ \frac{3\pi}{4} + 2\pi k\right\}, k \in \mathbb{Z}$



3

Ответ: $\left\{\frac{\pi}{4} + 2\pi m;\ \frac{5\pi}{4} + 2\pi m;\ -\frac{\pi}{4} + 2\pi m;\ \frac{3\pi}{4} + 2\pi m\right\}, m \in \mathbb{Z}$.

ШИФР: 350
(не заполнять)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

Юниор

Работа по математике

Дата 06.04.2023
Вариант № 4
Площадка написания: НИЯУ МИФИ
ФИО и рег. номер не указывать!

ОЦЕНКА
(не заполнять)

1	2	3	4	5	6	ИТОГО	Подпись
2	3	2				7	



№ 3

Дано
$\triangle BCD$ – реб; $A \in \overset{\smile}{BD}$; $C \notin \overset{\smile}{BD}$; $\angle BAD = 120°$; AC
$\omega(O; R)$ – опис. около $\triangle BCD$

Найти
S_{ABCD} – ?

Решение:

1. Пусть т. H_1 – сер. перп. к CD; т. H_2 – сер. перп. к BC; $AC \cap BD =$ CA

2. Пусть $\triangle BCD$ – вписан в ω (усл.):

2.1. H_1 – сер. п. (п.1); H_2 – сер. п. (п.1) $\Rightarrow H_1 \cap H_2 = O$ (по св-ву опис. окр.) $\Rightarrow OH_1, OH_2$ – сер. перп.

2.2. $\angle BAD$ – вписан в ω (по опр. вписан. уг.) $\Rightarrow \angle BAD = \frac{1}{2} \overset{\smile}{BCD}$

$\overset{\smile}{BCD} = 2\angle BAD = 240°$

2.3. $\triangle BCD$ – реб (усл.) $\Rightarrow$ $BC = CD$ (по опр. реб тр.); $\angle CBD = \angle CDB$ (по св-ву реб тр.)

2.4. $\angle CBD$ – вписан в ω (по опр.) $\Rightarrow \angle CBD = \frac{1}{2} \overset{\smile}{CD}$

$\angle CDB$ – вписан в ω (по опр.) $\Rightarrow \angle CDB = \frac{1}{2} \overset{\smile}{CB}$ $\Rightarrow \angle CBD = \angle CDB = \frac{1}{2}(\angle CB$ и $\angle CDB) = \frac{1}{4} \overset{\smile}{BCD} = 60°$

2.5. $\angle CBD + \angle CDB + \angle BCD = 180°$ (по т. о сум. угл. тр.) $\Rightarrow \angle BCD = \angle CBD = \angle C$
$= 60° \Rightarrow \triangle BCD$ – рбс (по призн. рбс тр.) $\Rightarrow$

$\Leftrightarrow BC = CD = BD$ (по опр. рбс тр.) ✓

3. 2 б. Пусть $\triangle CH_2O$, $\triangle CH_1O$ – пу (т.к. OH_1, DH_2 – сер. перп. (п.2.1)

CO - общ.

$CH_2 = \frac{1}{2} CB$ (OH_2 - с.л. (п. 2. 1))

$CH_1 = \frac{1}{2} CD$ (OH_1 - с.л. (п. 2. 1))

$CD = CB$ (п. 2. 5)

$\Rightarrow \triangle CH_2O = \triangle CH_1O$ (по ~~2 стор~~ гип. и кат.) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \angle BCA = \angle BCD$ (С Э ГУТ) $= \frac{1}{2} \angle BCD = 30^\circ$

~~2. [illegible]~~

4. Рассм. $\triangle CH_1O$ - п/у (аналог. п. 3):

4.1. $\angle DCA = 30^\circ$ (п. 3) $\Rightarrow OH_1 = \frac{1}{2} OC$ (по св-ву п/у тр.)

4.2. $CH_1^2 + OH_1^2 = CO^2$ (по т. Пифагора)

5. ~~Рассм. 5. Рассм. св.~~ 5. Рассм. $\triangle CBK$, $\triangle CDK$:

~~AC - диам.~~

$\angle BCK = \angle DCK$ (п. 4)

$\angle CBD = \angle CDB$ (п. 2. 3)

$BC = CD$ (по усл.)

$\Rightarrow \triangle CBK = \triangle CDK$ (по ~~2-м~~ ст. и 2 м усл.) $\Rightarrow BK = DK$ (С Э ГУТ) $\Rightarrow$

$\Rightarrow CK$ - мед. (по опр. мед.)

6. Рассм. $\triangle BCD$ - п/с (п. 2. 5):

6.1. CK - мед. (п. 5) $\Rightarrow$ CK - бис., выс. (по св-ву п/б тр.) $\Rightarrow$ CK - сер. п. (по опр. сер. п.)

6.2. $\triangle BCD$ - опис. в ω (усл.)

CK - сер. п. (п. 6.1)

$\Rightarrow OH_1 \cap OH_2 \cap CK = O$ (по св-ву опис. сер.)

~~3.~~

3. Рассм. ω:

3.1 CA - диам. $\Rightarrow CO = OA = \frac{1}{2} CA$ (CO, OA - рад. (по опр. рад.)) $\Rightarrow CO = OA = 2$

8. $CH_1^2 + OH_1^2 = CO^2$ (п. 4. 2.) ?

$CH_1^2 + \frac{1}{4} CO^2 = CO^2$ (п. 4. 1.)

$CH_1^2 = \frac{3}{4} CO^2$

$CH_1^2 = \frac{3}{4} \cdot 2^2$

$CH_1 = \sqrt{3} \Rightarrow DC = 2\sqrt{3}$ (OH_1 - сер. п. (п. 2. 1)) $\Rightarrow DC = BC = BD = 2\sqrt{3}$ (п. 2. 5)

3.3. $\angle BDA$, $\angle BCA$ - опис. оп. на одну дугу $\Rightarrow$

$\Rightarrow \angle BDA = \angle BCA = 30^\circ$ (по св-ву)

3.2. аналог. п. 3. 1 $\Rightarrow \angle CAD = \angle CBD = 60^\circ$

3.3. Из п. 3. 1 и п. 3. 2 $\Rightarrow \angle AKD = 180^\circ - 60^\circ - 30^\circ$ (по т. о сум. уг. тр.)

$\Leftrightarrow \angle AKD = 90^\circ \Rightarrow \angle AKD + \angle DKC = 180^\circ$

$\Rightarrow$ CK и CA - сост. одну прям. $CA \Rightarrow O \in CA$ ($O \in CK$ (п. 6. 2))

9. $\angle CKD = 90^\circ$ (CK - выс. (п. 6)) $\Rightarrow S_{\triangle ABCD} = \frac{1}{2} BD \cdot CA \cdot \sin \angle CKD = \frac{1}{2} BD \cdot CA =$

$= \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 4 = \boxed{4\sqrt{3}}$? Част случай!

(2)

Ответ: $4\sqrt{3}$.

N1

Пусть x - част. от дел. n на 100

y - ост. от дел. n на 100 $\Rightarrow n = 100x + y \Rightarrow$ n - счаст., если

$\frac{100x + y}{x + y} \in \mathbb{Z}$

ШИФР: 350
(не заполнять)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

Юниор

Работа по математике

Дата 06.04.2024
Вариант № 3
Площадка написания: дистанц. МИФИ
ФИО и рег. номер не указывать!

ОЦЕНКА
(не заполнять)

1	2	3	4	5	6	ИТОГО	Подпись

№1 (проф)

1. Если $n \le 2300 \Rightarrow$ ~~2700~~ $x = 24$, $y = 0 \Rightarrow \frac{2300}{24} \in \mathbb{Z}$ – верно $\Rightarrow n = 2300$ счаст.

3. Если $n \ne 2300 \Rightarrow x \le 23$, $y \in [1; 99] \Rightarrow$ ~~$23 \cdot y$~~ при $\frac{2300 \cdot y}{23 \cdot y} \in \mathbb{Z}$, n – счаст

4. Если y – чет. $\Rightarrow \frac{\text{чёт.} \cdot \text{чет.}}{\text{нечёт.} \cdot \text{чёт.}} \in \mathbb{Z} \Rightarrow \frac{\text{чёт.}}{\text{нечёт.}} \in \mathbb{Z}$ – есть реш. (⇒)

Если y – нечёт $\Rightarrow \frac{\text{чёт} \cdot \text{нечёт}}{\text{нечёт} \cdot \text{нечёт}} = \frac{\text{чёт}}{\text{нечёт}} \in \mathbb{Z}$ – нев., при любом y

(⇒) y – всегда чёт. $\Rightarrow y = 2f$, $f \in \mathbb{Z}$, $f \in [1; 49]$ (т.к. $f \cdot 2 = 98$ – макс.)

5. Из $\frac{2300 \cdot y}{23 \cdot y} \in \mathbb{Z}$ (п.3) $\Rightarrow \frac{2300 \cdot 2f}{23 \cdot 2f} \in \mathbb{Z}$ (⇐)

$\frac{2f \cdot 2300}{-2f \cdot 23}$ | $\frac{2f \cdot 23}{2}$ (Запом. y)

$\frac{2287}{2277}$

$\Rightarrow \frac{2f \cdot 2300}{2f \cdot 23} \le 1$

$2287 \mid 253$ | 9
-18
$\overline{67}$
-55
$\overline{12}$

$253 \mid 23$ | 11
-23
$\overline{23}$
-23
$\overline{0}$

(⇒) $1 + \frac{2277}{23 \cdot 2f} \in \mathbb{Z}$

$\frac{2277}{23 \cdot 2f} \in \mathbb{Z}$ (*)

$\frac{3 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 23}{23 \cdot 2f} \in \mathbb{Z}$

Т.к. $23 \cdot 2f$, при любом $f > 3$;

$\Rightarrow 23 \cdot 2f$ должен сост. из 2 и больше дел. (*) имелся (⇐)

При $f = 1 \Rightarrow \frac{3 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 23}{25} \in \mathbb{Z}$ – нев.

$f = 2 \Rightarrow \frac{3 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 23}{2 \cdot 2} \in \mathbb{Z} \Rightarrow \frac{11 \cdot 23}{3} \in \mathbb{Z}$ – нев.

$f = 3 \Rightarrow \frac{3 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 23}{2 \cdot 3} \in \mathbb{Z}$ – нев.

$f = 4 \Rightarrow \frac{3 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 23}{2 \cdot 4} \in \mathbb{Z}$ – нев.

$f = 5 \Rightarrow \frac{3 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 23}{2 \cdot 5} \in \mathbb{Z}$ – верно $\Rightarrow n = 2310$ – счаст.

$f = 6 \Rightarrow \frac{3 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 23}{2 \cdot 6} \in \mathbb{Z}$ – ~~верно~~ нев ⇔

$f = 7 \Rightarrow \frac{3 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 23}{2 \cdot 7} \in \mathbb{Z}$ – нев.

$f = 8 \Rightarrow \frac{3 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 23}{2 \cdot 8} \in \mathbb{Z}$ – нев.

$f = 9 \Rightarrow \frac{3 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 23}{2 \cdot 9} \in \mathbb{Z}$ – нев.

$f=10$

$f=11$

$f=12$

$f=13$

$f=14$

$f=15$

$f=16$

$f=17$

$f=18$

$f=19$

$f=20$

$f=21$

$f=22$

$f=23$

$f=24$

$f=25$

$f=26$

$f=27$

$f=28$

$f=29$

$f=30$

$f=31$

~~$\Leftrightarrow$~~ $\Leftrightarrow$ $23 \nmid 2f \Leftrightarrow \begin{cases} 3\cdot 3 \\ 3\cdot 11 \\ 3\cdot 23 \\ 3\cdot 3\cdot 11 \\ 3\cdot 3\cdot 23 \\ 11\cdot 23 \\ 11\cdot 3\cdot 23 \\ 11\cdot 3\cdot 3\cdot 23 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2f = -14 - \text{нев. т.к. } f\in[1;49] \\ 2f = 10 \\ 2f = 66 \\ 2f = 276 \\ 2f = 184 \\ 2f = 230 \\ 2f = 736 \\ 2f = 2254 \end{cases} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \begin{cases} f=5 \\ f=23 \\ f=38 \\ f=92 - \text{нев. (т.к. } f_2\in[7;49]) \\ f=115 - \text{нев. (т.к } f\in[1;49]) \\ f=368 - \text{нев. (т.к. } f\in[1;49]) \\ f=1472 - \text{нев. (т.к } f\in[1;49]) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f=5 \\ f=23 \\ f=38 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n=2310 - \text{счас.} \\ n=2346 - \text{счас.} \\ n=2386 - \text{счас.} \end{cases}$

6. Из n_2 и n_5 $\Rightarrow$ всего есть **4 счастливых n**

Ответ: 4

(2)